

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4170054 ONCALA-VALTAJEROS

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(E) Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000

Proposición como LIC: 08/2000

Clasificación como ZEPA: /

Actualización 07/2004

Área: 7393,8 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:

Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-6

12-7

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4020	*	Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix	2	0-2%
4030		Brezales secos europeos	1	0-2%
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	1	0-2%
5210		Matorrales arborescentes de Juniperus spp.	4	0-2%
6160		Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta	5	0-2%
6170		Prados alpinos y subalpinos calcáreos	5	2-15%
6210		Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)	25	2-15%
6430		Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino	1	0-2%
6510		Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	1	0-2%
7140		«Mires» de transición	1	0-2%
9120		Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)	1	0-2%
9230		Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica	7	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	1	0-2%
9380		Bosques de Ilex aquifolium	5	15-100%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1352	Canis lupus	Lobo		V		0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)**Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)****Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)****Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)****DESCRIPCIÓN DEL LUGAR****Usos del suelo:**

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	37
N09	Pastizales áridos. Estepas	8
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	6
N16	Bosques deciduos de hoja ancha	23
N17	Bosques de coníferas	11
N19	Bosques mixtos	9
N21	Áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)	5
N23	Otros territorios (incluyendo Ciudades, Pueblos, Carreteras, Vertederos, Minas, Zonas ind)	1

Otras características

Al este de la Sierra de Urbión y la Sierra Cebollera, el Sistema Ibérico pierde altitud y conforma una serie de suaves alineaciones montañosas, con predominio de orientación noroeste-sudeste, muy condicionadas por la actividad ganadera que sustentó en la primera mitad del siglo pasado. Constituye un paisaje de montaña de amplios horizontes con suaves laderas en el que se alternan altos páramos cubiertos por pastizales y brezales con bosquetes de muy diferente naturaleza: hayedos, robledales, enebrales de *Juniperus communis* y extensas acebedas. Los hayedos se sitúan en las zonas más frescas y umbrosas, a diferencia de los carrascales, que ocupan las solanas. Son abundantes los melojares y los pinares, aunque estos últimos proceden de recientes repoblaciones. Como se comentaba anteriormente, destaca la presencia de acebos que, si bien son frecuentes en todo el Sistema Ibérico, es en estas sierras donde aparecen los bosquetes más extensos, destacando la Dehesa de Oncala, o el cercano Acebal de Garagüeta.

Las sierras están salpicadas por pequeños pueblos prácticamente abandonados.

Calidad e Importancia:

Destacan las acebedas (hábitat más representativo del espacio) en masas más o menos densas dispersas entre extensos pastizales.

De entre los pastizales, cabe destacar por su enorme diversidad, los pastizales acidófilos que se presentan en la Dehesa Boyal del Puerto de Oncala, con gran abundancia de *Pulsatilla rubra* y *Trifolium montanum*, así como una gran cantidad de genisteas, donde destaca la rara *Cytisus decumbens*.

Vulnerabilidad:

La principal amenaza de este lugar la constituyen los parques eólicos, con pérdida del valor paisajístico. Además, la reducción del pastoreo esta propiciando la invasión por parte del matorral de hábitats asociados a este tipo de manejo. Finalmente, las repoblaciones forestales también constituyen un problema para la conservación de los pastizales.

Designación del lugar**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.
%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.