

FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES0000357 ALTOS CAMPOS DE GÓMARA

INFORMACIÓN GENERAL

Relación con otros lugares Natura 2000:

(J) Lugar designado ZEPA que solapa parcialmente un lugar propuesto como LIC

Proposición como LIC: /

Clasificación como ZEPA: 11/2003

Actualización: 01/2004

Área: 15202,8 ha.

Región Administrativa:

Provincia: %:
Soria 100

Nº de Mapa S.G.E. (1/100000): 12-7
12-8

Región Biogeográfica:

Atlántica

Mediterránea

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)

Código	Prior.	Descripción	%	Superficie relativa
4090		Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga	26	0-2%
6170		Prados alpinos y subalpinos calcáreos	1	0-2%
6220	*	Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea	1	0-2%
6420		Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion	1	0-2%
8130		Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos	1	0-2%
8210		Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica	1	0-2%
9230		Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica	0	0-2%
9240		Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis	1	0-2%
92A0		Bosques galería de Salix alba y Populus alba	1	0-2%
9340		Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia	25	0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A092	Hieraaetus pennatus	Aguiilla calzada	P			0-2%	Bueno
A091	Aquila chrysaetos	Aguila real	1p			0-2%	Bueno
A222	Asio flammeus	Buho campestre	P			0-2%	Bueno
A215	Bubo bubo	Búho real	P			0-2%	Bueno
A243	Calandrella brachydactyla	Terrera común	P			0-2%	Bueno
A224	Caprimulgus europaeus	Chotacabras gris	P			0-2%	Bueno
A084	Circus pygargus	Aguilucho cenizo		3-4 p		0-2%	Bueno
A399	Elanus caeruleus	Elanio azul	P	P		0-2%	Bueno
A379	Emberiza hortulana	Escribano hortelano	P			0-2%	Bueno
A103	Falco peregrinus	Halcón peregrino			P	0-2%	Bueno
A255	Anthus campestris	Bisbita campestre		P		0-2%	Bueno

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
A078	Gyps fulvus	Buitre leonado	2-5 p			0-2%	Bueno
A128	Tetrax tetrax	Sisón	60-80m			0-2%	Bueno
A338	Lanius collurio	Alcaudón dorsirrojo	P			0-2%	Bueno
A246	Lullula arborea	Totovía	P			0-2%	Bueno
A242	Melanocorypha calandra	Calandria común	P			0-2%	Bueno
A073	Milvus migrans	Milano negro	P			0-2%	Bueno
A077	Neophron percnopterus	Alimoche		P		0-2%	Bueno
A279	Oenanthe leucura	Collalba negra	P	P		0-2%	Bueno
A129	Otis tarda	Avutarda			P	0-2%	Bueno
A420	Pterocles orientalis	Ganga ortega	15-20 p			0-2%	Bueno
A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax	Chova piquirroja	P			0-2%	Bueno
A302	Sylvia undata	Curruca rabilarga	P			0-2%	Bueno
A245	Galerida theklae	Cogujada montesina	P			0-2%	Bueno

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Código	Nombre	Nombre común	Población			Población relativa	Valor global
			Sedentaria	Nidificante	Invernante de paso		
1304	Rhinolophus ferrum-equinum	Murciélago grande de herradura				0-2%	Bueno
1303	Rhinolophus hipposideros	Murciélago pequeño de herradura				0-2%	Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Usos del suelo:

Código	Nombre	Cobertura
N08	Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana	3
N09	Pastizales áridos. Estepas	7

Código	Nombre	Cobertura
N12	Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)	77
N18	Bosques esclerófilos	11
N19	Bosques mixtos	1
N22	Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores. Nieves o hielo	1

Otras características

El espacio se extiende por las comarcas de Campos de Gómara (Alto Rituerto) y Araviana al este de la provincia de Soria, limitando al este con Zaragoza. Forma parte de lo que en geología se conoce como corredor intraibérico o plataforma soriana, una cuenca intramontañosa formada por rellanos muy planos que se encuentran a gran altitud (1.000-1.100 m), y totalmente dedicados al cultivo cerealista. Se encuentran también algunas sierras preibéricas, formadas por calizas marinas cretácicas que superan en ocasiones los 1.200 m. como la Sierra de Cardejón, la Sierra de Santa Bárbara, la Sierra de Corija o limitando hacia el este, la Sierra de la Vigornia en donde se encuentran las hoces del río Manubles. Algunos bancos de calizas han formado lomas planas y deforestadas muy aptas para las aves esteparias como las lomas de Pinilla o la Cañada Hermosa de Villaseca de Arciel. En algunos sectores hay manchas con vegetación natural principalmente de encina, quejigo y matorral. Destaca la dehesa de Pinilla del Campo, donde subsisten viejos ejemplares de quejigos y fresnos.

Calidad e Importancia:

El interés del espacio son las aves esteparias entre las que destaca la importantes poblaciones reproductoras de Sisón y Ortega.

Vulnerabilidad:

Los principales factores de vulnerabilidad de la zona proceden de cambios o transformaciones de las actuales formas de cultivo.

Designación del lugar**DESCRIPCIÓN DE CAMPOS**

Prior.: Hábitat o especie prioritaria cuando se marca con un *.

%: Porcentaje de superficie ocupada por el hábitat en el Lugar.

Superficie relativa: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que abarca dicho tipo de hábitat natural en lo que se refiere al territorio nacional.

Valor Global: Valor global desde el punto de vista de la conservación del hábitat o de la especie.

Nombre: Nombre científico de la especie. Se incluyen los nombres tal como aparecen en los anexos de las Directivas y en los formularios oficiales, aunque algunos actualmente han cambiado de denominación.

Población: Datos conocidos de la población expresados en (p) parejas, (i) individuos, (m) machos, (f) hembras, o a falta de datos más precisos (C) común, (R) excasa, (V) muy excasa y (P) indica únicamente presencia.

Población relativa: Tamaño de la población de la especie presente en el lugar con respecto a la población nacional.